

## Standard 25 Palliative Betreuung

### Benchmarking KSSG gegenüber UK Hospitals

#### Ziel 2: Subcutane Bedarfsmedikamente sind verordnet

Symptome	KSSG 2006 n=20	KSSG 2007 n=32	KSSG 2009 n=25	KSSG 2010 n=40	UK-national (Hosp.) 2006/2007 n=118
Schmerz	95%	94%	96%	97%	87% - 98%
Agitation	85%	93%	96%	97%	76% - 93%
Bronchiale Sekr.	75%	90%	92%	95%	70% - 92%
Nausea	75%	87%	96%	95%	73% - 93%
Dyspnoe	-	97%	96%	97%	53% - 80%

#### Ziel 5: Die Einsicht des Patienten/Familie in seinen Gesamtzustand ist erfasst

	KSSG 2006 n=20	KSSG 2007 n=32	KSSG 2009 n=25	KSSG 2010 n=40	UK-national (Hosp.) 2006/2007 n=88-116
Pat. Diagnose bew.	60%	59%	52%	90%	45% - 72%
Fam. Diagnose bew.	95%	100%	100%	98%	78% - 96%
Pat. sterben bewusst	50%	59%	48%	90%	33% - 60%
Fam. sterben bewusst	90%	100%	100%	95%	77% - 93%

#### Ziel 9: Der Hausarzt ist über den Zustand des Patienten informiert

	KSSG 2006 n=20	KSSG 2007 n=32	KSSG 2009 n=25	KSSG 2010 n=40	UK-national (Hosp.) 2006/2007 n=106
Hausarzt informiert	70%	76%	67%	50%	14% - 38%

Version	Autor	Dateiname	Dokument-Nr.	Seite
11.04.11	S. Eychmüller B. Grossenbacher	Benchmarking KSSG gegenüber UK Hospitals	1	1 / 1